

Ademhaling hond

Een gezonde hond heeft in rust een ademhalingsfrequentie van 10 tot 30 keer per minuut.

De ademhaling mag niet gepaard gaan met geluid.

Bij een snelle ademhaling, diepe ademhaling of andere ademhalingsproblemen is het verstandig om de hulp van een dierenarts in te roepen.

Ademhalingsproblemen kunnen veroorzaakt worden door problemen van de neus, keel, het strottenhoofd, de luchtpijp en bronchiën, de longen, de borstkas, het middenrif of het hart.

Ademhaling met geluid

Dieren met een vernauwing van de luchtwegen (neus tot en met luchtpijp) kunnen geluid maken bij het ademen. Bij ernstige benauwdheid wordt bij inademen de buik of de borstingang naar binnen gezogen.

Als de hond neusuitvloeiing heeft, is er waarschijnlijk sprake van een neus- of keelprobleem (niesziekte, poliep, vreemd voorwerp, strictuur, tumor). Als het geluid niet verdwijnt, als het dier door de mond ademt, zit het probleem in de keel, het strottenhoofd of de luchtpijp.

Te snelle ademhaling

Een snelle ademhaling kan wijzen op stress, bloedarmoede of benauwdheid. Bloedonderzoek en röntgenfoto's zijn vaak zeer informatief.

Hijgen hond

Hijgen (snel en oppervlakkig ademen) is geen teken van benauwdheid.

Honden hijgen om af te koelen.

Uw hond zweet!

Mensen zweten als ze het warm hebben. Honden hijgen. Zweten doen ze minder. Een warm kledingstuk uittrekken of een knoopje los doen kunnen ze niet. Hijgen is dus voor een hond effectiever dan zweten.

Met een snelle oppervlakkige ademhaling komt er niet meer zuurstof in de longen.

Hijgen heeft dus niets te maken met benauwdheid.

Hijgen en overgewicht

Naar schatting is 35% van alle honden en katten in Nederland te dik. Extra kilo's meedragen kost meer energie. Bovendien hebben te dikke honden het sneller warm, want vet isoleert. Honden met obesitas hijgen dus sneller en vaker.

Huigen uit onrust/ zenuwachtigheid

Als u zenuwachtig bent, gaat u mogelijk meer zweten. Uw hond gaat hijgen. Als u zich hierover zorgen maakt, voelt uw hond dit. Hij denk dat u zenuwachtig bent, wordt hiervan zenuwachtig en gaat nog meer hijgen.

Hijgen en pijn/ziekte

Pijn en ziekte kunnen gepaard gaan met hijgen. Uw hond kan bij pijn en ziekte niets zeggen, maar als uw hond goed eet, normaal drinkt, graag rent en speelt en een normaal uithoudingsvermogen heeft, is uw hond (waarschijnlijk) gezond.

Ga bij twijfel naar een dierenarts.

Hijgen of Benauwd?

Een gezonde hond ademt (in rust) 10 tot 30 keer per minuut. Een hond die hijgt, ademt misschien wel 100 keer per minuut. Dieren die benauwd zijn ademen meestal iets vaker dan 30 keer per minuut. Ook kunnen ze anders ademen: bij inademen kan de buik naar binnen worden gezogen of de borstkas zet verder uit dan normaal.

Honden met een vernauwing van de grote luchtwegen (neus, keel, stembanden of luchtpijp) maken een ander *geluid* bij het ademen.

Te diepe ademhaling

Een te diepe ademhaling wijst op benauwdheid. In sommige gevallen wordt bij inademen de buik of de borstingang naar binnen gezogen. Als de hond geen geluid maakt bij het ademen wijst dit vaak op vocht rond de longen of een gaatje in het middenrif (hernia diafragmatica).

Een röntgenfoto is dan zinvol. Bij vocht rond de longen zal de dierenarts u aan raden om een echo te maken en vocht af te nemen voor onderzoek.

Vocht in/achter longen

Zit er vocht *in* de longen of *achter* de longen? Dat maakt nogal wat verschil. De oorzaken zijn anders en de behandeling is anders. In beide gevallen is de patiënt benauwd.

Vocht *in* de longen bij de hond

Als er vocht *in de longen* zit, is de patiënt meestal benauwd door *hartfalen*. Het hart blijkt niet goed te werken. De dierenarts schrijft vaak plasmedicijnen voor en andere hartmedicatie. De dierenarts hoort het vocht als hij naar de longen luistert of ziet het vocht op een *röntgenfoto*.

Moeite met inademen

Honden met een voorste-luchtwegprobleem (neus, luchtwegen) hebben vaak moeite met inademen. Vaak maken deze dieren geluid bij het inademen.

Moeite met uitademen

Honden met een longprobleem (COPD, longemfyseem, interstitiële pneumonie) gebruiken vaak de buikpers om uit te ademen. De diagnose meestal goed te stellen met een longfoto.

Uw hond hoest

Een *hond* kan, naast problemen aan de luchtwegen, ook hoesten ten gevolge van hartproblemen.

Een röntgenfoto is vaak zeer zinvol. In sommige gevallen is verder onderzoek (bronchoscopie) aan te raden.

Kennelhoest

Kennelhoest is het best te vergelijken met onze verkoudheid, maar het is hardnekkiger en duurt langer. Het is een veel voorkomende besmettelijke aandoening, waarvan vrijwel elke hond volledig zal herstellen.

Symptomen van kennelhoest

Niet elke hond met kennelhoest hoest. Sommigen hebben alleen een snotneus en ontstoken ogen. Over het algemeen hebben dieren geen koorts en eten en drinken ze normaal. Als een dier erg hoest, kan dit leiden tot kokhalzen/overgeven.

In zeldzame gevallen kan de patiënt een longontsteking krijgen.

De diagnose kennelhoest

De diagnose wordt vaak op basis van de klinische verschijnselen gesteld. De specifieke ziekteverwekkers kunnen in een laboratorium worden vastgesteld met behulp van een bacteriekweek of zogenaamd PCR onderzoek.

Omdat de ziekte kan lijken op hondenziekte, is het soms raadzaam, vooral bij pups, ook een test te doen op deze ziekte. Ook hondengriep kan vergelijkbare klachten geven.

De behandeling van kennelhoest

Een warme en een stressvrije omgeving is belangrijk voor een goed herstel. Rust is belangrijk. Bij het uitlaten kan een halsband het best worden vervangen voor een borsttuig. De dierenarts kan u hoestdrank of en antibiotica voorschrijven.

Hoe krijgen honden Kennelhoest?

Kennelhoest krijg je van een andere hond. Dat kan een hond zijn met duidelijke kennelhoestklachten, maar ook honden met milde klachten, bijvoorbeeld alleen een snotneus. Als een hond is hersteld van kennelhoest, neemt de kans op overdracht fors af.

3-10 dagen na besmetting kan een hond kennelhoest verschijnselen krijgen.

Bron Medisch Centrum voor Dieren

www.mcvoordieren.nl